

محل گلوموس تومور در گوش میانی

بیمار گرامی، چنانچه شما تحت عمل جراحی قرار گرفته اید، رعایت توصیه موارد زیر را به شما توصیه می کنیم:

- رژیم غذایی خاصی نیاز ندارید سعی کنید. غذای نرم بیشتر استفاده کنید.



- ۷ روز استراحت مطلق داشته باشید.




- سرفه و عطسه نکنید.




- تا مدتی بر روی ناحیه عمل شده نخوابید.

گلوموس ژوگولار



تومور گلوموس ژوگولار از دسته تومورهایی است که از ورید ژوگولار ورید تخلیه کننده خون مغز منشاء می گیرد. این تومور می تواند اعصاب مغزی تحتانی از شماره ۷ تا ۱۲ را تحت شعاع خود قرار دهد. اگر عصب ۷ درگیر باشد فلج صورت و اگر عصب ۸ درگیر باشد احتمال ناشنوایی وجود دارد. اگر عصب ۱۱ درگیر باشد شانه خود را نمی توانید بالا ببرید و درد شدید در شانه دارید.



درمان:

درمان این تومور جراحی می باشد. مگر در مواردی که قابل جراحی نیست مثل تومورهای بزرگی که کل قاعده جمجمه را گرفته است که در این حالت از پرتودرمانی گاما نایف استفاده می شود. پرتودرمانی هر چند سبب تخریب تومور نمی شود ولی از پیشرفت و رشد مجدد تومور جلوگیری می کند.



آموزش به بیمار

کد ۷۴

گلوبوس ژوگولار



تقسیم: کبری قره باغ

تأیید کننده: گروه گوش و حلق و بینی مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)

سال ۱۳۹۸

آدرس: خیابان سارخان - خیابان نیایش - مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص) - تلفن: ۶۴۳۵۱

<http://hrmc.iums.ac.ir/>



- هر ۶ ساعت سفالکسین (طبق دستور پزشک) یک عدد میل نمایید.
- در صورت درد استامینوفن روزی ۳ عدد میل کنید.
- در بهداشت ناحیه عمل دقت لازم را داشته باشید.
- جهت جلوگیری از زور زدن روزی ۳ قاشق شیر منیزیوم میل کنید.
- مراجعات بعدی یک تا شش ماه بعد است.
- تا پنج سال سالیانه MRI انجام دهید.
- ممکن است به دنبال عمل دچار فلج موقت صورت یا گرفتگی صدا شوید. به توصیه های پزشک عمل کنید.
- در صورت بروز هر یک از موارد زیر به پزشک مراجعه کنید:
 - ترشح مایع شفاف از زخم پایینی
 - پریدن غذا به داخل نای
 - تب بالا
 - سردرد شدید یا هر گونه علائم مغزی

