

بیماری سل

سل نوعی عفونت است که معمولاً ریه را درگیر می‌کند ولی گاهی نیز می‌تواند قسمت‌های دیگر مثل کلیه، مغز، استخوانها و غدد لنفاوی را درگیر کند.




علائم سل ریوی:

شامل تب، کاهش وزن، بی‌اشتهایی، ناراحتی عمومی، ضعف، سرفه بدون خلط و بعداً با خلط چرکی و اغلب دارای رگه‌های خونی می‌باشد.

راه انتقال:

بیماری سل از طریق هوا منتقل می‌شود. با سرفه شخص مبتلا، باکتری‌های سل در هوا پخش می‌شود و برای ساعتها در محیط می‌ماند. هر شخصی که از این هوای آلوده برای مدتی استنشام کند ممکن است مبتلا شود. شخص مبتلا به سل بایستی دهان خویش را هنگام سرفه یا عطسه ببوشاند تا باکتریها در هوا پخش نشود.




اقدامات درمانی:

درمان به وسیله دارو می‌باشد که در دو مرحله انجام می‌شود:

مرحله اول که باکتری‌ها را ضعیف می‌کند و در آن اکثر باکتریها کشته می‌شوند. این مرحله دو ماه طول می‌کشد.
مرحله دوم که در این مرحله باکتریها به طور کامل محو می‌شوند و چهار ماه طول می‌کشد.
انداختن عکس ریه در پایان درمان سل می‌تواند کمک کننده باشد.

بیمار گرامی ضمن آرزوی سلامتی برای شما، توجه شما را به مطالب زیر جلب می‌نمایم:

- به علت اینکه داروهای ضد سل از طریق کبد از بدن انسان دفع می‌شود، انجام آزمایشات کبدی در هنگام مصرف داروهای ضد سل می‌تواند کمک کننده باشد.
- علایمی مثل ادرار تیره، فقدان اشتها، پوست تیره را گزارش کنید.
- در صورت وجود دردهای مفصلی حتماً به پزشک اطلاع دهید زیرا می‌تواند مربوط به عوارض داروی پیرازینامید باشد.
- میزان پلاکت خون خود را بررسی نموده و در صورت کاهش آن به پزشکتان اطلاع دهید.
- معاینات چشم پزشکی را فراموش نکنید زیرا یکی از عوارض اتامبوتول که از داروهای ضد سل است درگیری عصب چشم می‌باشد.
- دیگر علایم مثل ناراحتی گوارشی و خارش بعد از اتمام درمان بهتر خواهد شد.
- داروی ریفامپین رنگ ادرار را نارنجی می‌کند و حتی رنگ لنز چشم را تغییر می‌دهد. پس بهتر است در این مدت از عینک استفاده کنید.
- حداقل هر ۲ ساعت تمرینات تنفسی انجام دهید مثل فوت کردن در بادکنک، نفس‌های عمیق، دمیدن در نی که درون لیوان پر از آب قرار دارد.
- از بخور سرد برای مرطوب کردن راه تنفس خود استفاده کنید.



آموزش به بیمار

کد ۴۸



مجمع تشخیص و نظارت سلامت ایران

سل



بیماری سل

طیسم‌کننده: کبری قره‌باغ
تایید‌کننده: دکتر مهرداد طالبی طاهر

سال ۱۳۹۵

آدرس: خیابان سارخان - خیابان نیایش - مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص) - تلفن: ۶۴۳۵۱

<http://hrmc.iums.ac.ir/>

- در صورت بروز تهوع و استفراغ و دردهای شمی به پزشک مراجعه نمایید.
- برای تخلیه ترشحات ریه خود از کسی بخواهید ضرباتی بر روی پشت و یا قفسه سینه شما بزند.
- مایعات سرد نخورید و از دود سیگار، بوی عطر، گرده گلها، غذاهای آلرژی‌زا مثل تخم مرغ، شکلات، گوجه فرنگی خودداری کنید تا دچار تنگی نفس نگردید.
- در صورت نیاز اکسیژن استفاده کنید.
- تغذیه مناسب داشته باشید.
- در صورت بروز استفراغ و نیز بعد از هر بار تغذیه از دهانشویه استفاده کنید تا از بیماری دهان و دندان و لثه جلوگیری شود.
- به علت خطر خونریزی لثه‌ها از مسواک نرم استفاده کنید.
- در صورت بروز استفراغ و درد شکمی به پزشک مراجعه نمایید.



- از سبزی، سالاد و ماست همراه غذا استفاده کنید.
- از مصرف غذاهای نفاخ و گازدار خودداری کنید.
- از غذاهای مقوی مثل جگر، سبزیجات، کلم و میوه‌ها و حبوبات استفاده کنید.
- داروی ایزونیازید و ریفامپین را با معده خالی و یا ۲ ساعت قبل یا ۱ ساعت بعد از غذا میل کنید.
- اتامبوتول بهتر است همراه غذا میل شود.
- معاینه چشم و کنترل فشار خون را در طول درمان فراموش نکنید.
- حتما از داروی ویتامین B6 (ب۶) در طول درمان استفاده کنید.

