



بلوک شبکه سلیاک



بلوک شبکه سلیاک یعنی بی حس کردن عصب جهت کاهش درد. این بلوک را می توان در کسانی که از درد در ناحیه شکم و پهلوها، پیش صفاق و یا دردهای بالای شکم و حتی دردهای سرکش سرطانی مثل سرطان سرپانکراس، دردهای سرکش ناشی از آمبولیز شینی شریان کبدی، درمان سرطان و گاهی دردهای شکمی شدید یا درد قفسه سینه ناشی از نارسایی شریانی رنج می برند، بکار برد.

بیمار گرامی چنانچه شما کاندید این اقدام هستید، به موارد زیر توجه نمائید:

در هنگام بلوک، شما در وضعیت دمر قرار گرفته و محل بلوک استریل می شود. سپس بعد از بی حسی، توسط پزشک مربوطه بلوک برای شما انجام می شود.



شما ممکن است پس از بلوک دچار این عوارض بشوید که گذرا می باشد:

۱- کاهش فشار خون که در این صورت برای شما مایع درمانی یا سرم درمانی انجام می شود.

۲- ممکن است دچار گزگز یا مور مور شدن اندامها بشوید که این حالت پس از چند ساعت برطرف می شود.

۳- ممکن است دچار افزایش حرکات روده و یا اسهال شوید. در این صورت به پزشک خود اطلاع دهید تا با جایگزینی مایعات درمان انجام پذیرد.

مراقبت‌های پس از بلوک:

۱ - به هیچ وجه نباید از حالت خوابیده به سرعت بنشینید یا بایستید زیرا دچار کاهش فشار خون وضعیتی می شوید. لذا ابتدا اول باید سر تخت را بالا آورده و بعد به آرامی بنشینید و پس از گذشت زمان می توانید بنشینید.

۲ - معمولاً بین ۳۶ تا ۴۸ ساعت بعد اسهال برطرف می شود.

۳ - ممکن است در محل ورود سوزن حین بلوک در ناحیه پشت احساس درد بکنید. گاهی ممکن است این درد تا چند روز طول بکشد و حتی ممکن است در هنگام دم و بازدم تنفس تشدید پیدا کند اما پس از چندروز بهبود می یابد.

۴ - به ندرت ممکن است مشکلات زیر بروز نماید که در اینصورت به سرعت پزشک متخصص درد را مطلع نمائید:

- وجود خون در ادرار
- فلج اندام ها
- ایجاد تشنگی، تنفس شدید و سیانوز
- دردهای شدید قفسه سینه و پشت
- کاهش شدید فشار خون
- بی قراری.



آموزش به بیمار


کد ۶



بلوک شبکه سلیاک

طسیم‌کننده: مهین قاسمی (کارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سلامت)

تأییدکننده: دکتر فرناز ایمانی (فلوشیپ تخصصی درد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران)



سال ۱۴۰۰

آدرس: خیابان سارخان - خیابان نیایش - مجمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص) - تلفن: ۶۴۳۵۱

<http://hrmc.iums.ac.ir/>