




بلوک گانگلیون ایمپار (والتر)



در بیمارانی که از درد ناحیه تناسلی، مقعد رنج می‌برند می‌توان یکی از عصبهای آن ناحیه را بیحس نمود. این کار توسط پزشک و در اتاق عمل انجام می‌شود. این عمل بلوک گانگلیون ایمپار(والتر) گفته می‌شود.

شما در هنگام عمل دمر قرار می‌گیرد و آن محل استریل می‌شود. سپس بعد از بیحسی، توسط پزشک برای شما بلوک انجام می‌شود.





Coccygeus muscle
Coccyx
Sacrospinous
ligament




عوارض:

پس از عمل ممکن است دچار این عوارض گذرا بشوید:

۱- خونریزی

۲- درد

۳- عفونت و تشکیل فیستول



- اگر دچار خونریزی شدید استفاده از کمپرس سرد در محل تزریق بسیار موثر است و درد شما کاهش می یابد.

- اگر دچار عفونت شدید، بلافاصله به پزشک مربوطه مراجعه کرده یا با ایشان تماس بگیرید. علائم عفونت تب و قرمزی و التهاب می باشد.

- در صورت بروز هرگونه اختلال روده ای مانند اسهال و یبوست یا اختلال مثانه ای مانند بی اختیاری یا عدم دفع ادرار فوراً به پزشک مربوطه مراجعه کنید.

بیمار گرامی لازم به ذکر است که در این بلوک:

- کاهش درد بیش از ۷۵ درصد می باشد. مدت بی دردی از ۴ هفته تا مادام العمر می باشد.
 - چنانچه از داروهای رقیق کننده خون استفاده می کنید قبل از عمل پزشک خود را مطلع کنید.
- شما پس از از بین رفتن کامل بیحسی پاها و ضعف قادر به راه رفتن هستید اما جهت خروج از بیمارستان حتما باید یک نفر همراه داشته باشید.



آموزش به بیمار

کد ۵۸



بلوک گانگیون ایملار (والتر)



طهیم کننده: مهین قاسمی
تایید کننده: دکتر فرناو ایمانی

سال ۱۴۰۰

آدرس: خیابان سارخان - خیابان نیایش - مجمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص) - تلفن: ۶۴۳۵۱

<http://hrmc.iums.ac.ir/>