


آنژیوپلاستی کرونری



ممکن است سرخرگهای قلب متعاقب رسوب کلسترول، سلولها و سایر مواد دچار گرفتگی شوند. این امر سبب کاهش جریان خون به قلب شده و در نتیجه احساس ناراحتی در قفسه سینه رخ می دهد. گاهی ممکن است یک لخته خون به شکل ناگهانی ایجاد شده و به طور کامل جریان خون را قطع نماید که این امر منجر به حمله قلبی می شود. آنژیوپلاستی سبب باز شدن سرخرگهای دچار انسداد شده و جریان خون را به عضلات قلب بر می گرداند.

آنژیوپلاستی یک روش مداخله کرونری از طریق پوست (PCI) می باشد (و نه یک روش جراحی)، که از طریق یک سوراخ کوچک در سرخرگ پا یا دست صورت گرفته و از طریق بادکردن یک بادکنک کوچک موجود در سر کاتتر، سرخرگ قلبی دچار انسداد را باز می سازد.

چرا شما نیاز به آنژیوپلاستی دارید؟

ممکن است افراد دچار انسداد در سرخرگهای قلبی، چنانچه احساس ناراحتی زیادی در قفسه سینه کنند یا انسداد سرخرگهای قلبی آنها را در معرض خطر حمله قلبی یا مرگ قرار بدهد، نیاز به آنژیوپلاستی پیدا کنند. سالانه افراد بسیار بیشتری تحت آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی کرونری قرار می گیرند.



آنژیوپلاستی قلب



قبل از عمل



بعد از عمل


آیا آنژیوپلاستی با درد همراه است؟

خیر، آنژیوپلاستی سبب درد بسیار کمی می شود. پزشک محلی که کاتتر وارد می شود را بی حس می کند. ممکن است هنگامی که کاتتر وارد می شود، شما اندکی احساس درد کنید.



شما بیدار و هوشیار هستید، اما ممکن است جهت آرامش بیشتر به شما دارو داده شود. ممکن است آنژیوپلاستی از ۳۰ دقیقه تا چندین ساعت بسته به نوع انسداد و تعداد انسدادها به طول انجامد.

ممکن است محل وارد شدن کاتتر زخمی شود و کبود شدگی نیز شایع است. اگر متوجه خونریزی یا افزایش درد یا تورم شدید، به پزشک خود اطلاع بدهید.



پس از آنژیوپلاستی چه می شود؟

- زمانی که کاتتر از پای شما خارج می شود، یک پرستار یا پزشک معمولاً فشار مستقیمی را به مدت ۱۵ دقیقه یا بیشتر بر روی محل وارد شدن کاتتر جهت اطمینان از عدم خونریزی داخلی وارد می کند.
- در مواردی که اقدامات از دست انجام شده است، از وسیله ای روی میچ دست جهت فشار و بند آوردن خون استفاده می شود.

- اگر آنژیوپلاستی از طریق پا صورت گرفت، شما برای چند ساعت به آرامی به پشت می‌خوابید و پزشک یا پرستار شما را از لحاظ علائم خونریزی یا درد قفسه سینه بررسی می‌کند. اگر آنژیوپلاستی از طریق دست صورت گیرد، شما نیاز به خوابیدن در بستر ندارید.

- تقریباً همواره می‌بایست یک شب را جهت استراحت در بیمارستان سپری کنید. گاهی اقامت بیشتری هم مورد نیاز است.



- در صورت انجام آنژیوپلاستی هنوز برای ایجاد لخته در داخل استنت و در نتیجه انسداد جریان خون سرخرگ خطر وجود دارد. پزشک شما جهت پیشگیری از این امر برای شما آسپیرین و کلوپیدگrel یا سایر داروها را تجویز خواهد کرد. مصرف این داروها تا زمان توصیه شده توسط پزشک ضروری است.



- از برداشتن وزنه سنگین یا فعالیت جسمانی شدید در ۱-۲ روز اول پس از عمل خودداری کنید تا محل آنژیوپلاستی در دست یا پای شما بهبود یابد.

- در مورد عوامل خطرزای قلبی عروقی خودتان که باید آنها را اصلاح کنید، آموزش لازم را ببینید.




واحد آموزش به بیمار- مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی حضرت رسول اکرم (ص)

آموزش به بیمار

کد ۱۲۲



آنژیوپلاستی کرونری



مطیم کننده: مهین قاسمی (کارشناس ارشد آموزش

بهداشت و ارتقا سلامت)

تأیید کننده: دکتر سید هاشم سزاوار (فلوشیپ فوق تخصصی

اقدامات مداخله ای قلب و عروق)

سال ۱۴۰۰

آدرس: خیابان سارخان - خیابان نیایش - مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص) - تلفن: ۶۴۳۵۱

<http://hrmc.iums.ac.ir/>