

آندوسکوپی فوقانی دستگاه گوارش

آندوسکوپی فوقانی که در این پمفت به اختصار آندوسکوپی نامیده می‌شود، دیدن مری، معده و دوازده‌های بوسیله دستگاه مخصوص می‌باشد که توسط پزشک انجام می‌شود. از آندوسکوپی برای تشخیص، نمونه‌برداری و درمان ضایعات گوارشی استفاده می‌شود.



روش انجام:

یک لوله باریک و انعطاف‌پذیر حاوی دوربینی بر یک سر آن، از طریق دهان وارد مری و سپس معده و دوازده‌های می‌شود.

برای انجام آندوسکوپی بیمار

باید به سمت چپ خود بخوابد و آندوسکوپ تحت آرام بخش و یا بیهوشی سطحی انجام گردد. پس از انجام آندوسکوپی بیمار باید به مدت یک ساعت تحت مراقبت باشد تا اثر داروی آرام بخش در بدن کاهش یابد. عادت غذایی پس از آندوسکوپی مثل قبل ادامه یابد.

نکات قابل توجه:

- آندوسکوپی ترس ندارد، و حتی بدون بیهوشی قابل انجام است ولی در اکثر مراکز با بیهوشی و با آرام بخشی انجام می‌شود.
- مدت زمان انجام آندوسکوپی حداقل تا ۲۰ دقیقه می‌باشد.
- از ۶ تا ۸ ساعت قبل ناشتا باشید.
- به علت تجویز داروی بی‌حسی روی مخاط حلق، تهوع کاهش پیدا می‌کند.

- در خصوص شروع رژیم غذایی از پزشک خود سؤال نمایید.

کولونوسکوپی دستگاه گوارش



کولونوسکوپی یعنی دیدن روده بزرگ بوسیله دستگاه مخصوص که توسط پزشک انجام می‌شود.

روش کولونوسکوپی:

یک لوله قابل انعطاف که یک دوربین کوچک ویدئویی به آن وصل می‌باشد، از طریق مقعد وارد روده بزرگ می‌شود.



بیمار باید به سمت چپ خوابیده و پاهاش را داخل شکم خود جمع کند تا پزشک کولونوسکوپی را انجام دهد.

نکات قابل توجه :

- روده‌ها باید پاک باشد و مدفوع کاملاً تخلیه شده باشد. به همین دلیل ۲۴ تا ۶ ساعت قبل از کولونوسکوپی باید مایعات صاف مصرف کنید. ملین استفاده کرده و ۶ ساعت قبل از کولونوسکوپی ناشتا بمانید.
- چنانچه مشکل قلبی و دریچه‌ای دارید حتماً پزشک تان را مطلع کنید.

آمادگی های لازم قبل از انجام:

- اگر داروهای خاص مصرف می کنید یا مشکل مقعدی دارید، به داروهای بی هوشی حساسیت دارید، حامله هستید یا مشکل بیماری قلبی دریچه ای دارید، حتماً پزشکتان را در جریان بگذارید.

- قبل از کلونوستکوپی از مصرف غذای جامد و مواد غذایی قرمز رنگ و قرص آهن و مصرف موادی که آهن دارند خودداری نمایید.

- قهوه و چای و مایعات زیاد مصرف نمایید.
- حتماً یک نفر همراه داشته باشید.

- حين انجام کولونوستکوپی ممکن است احساس دفع یا دل پیچه به شما دست دهد در این صورت باید به آرامی از طریق دهان نفس کشیده تا عضلات شکم شل شود. خروج هوا از اطراف کولونوستکوپی عادی می باشد و نباید شرمنده شوید.

- کولونوستکوپی معمولاً نیم ساعت طول می کشد. بعد از کولونوستکوپی باید ۱ تا ۲ ساعت تحت نظر باشید تا اثر داروها از بین برود.
- مایعات فراوان استفاده کنید تا آبی که از دست داده اید جبران شود.



- رزیم غذایی عادی خود را از سر بگیرید.




آموزش به سهار

کد ۶۵

آندوسکوپی و کولونوسکوپی

طنیم کننده: مسین قاسمی (کارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سلامت)



تمایز کننده: دکتر غلام رضا برمند (تحصص داخلی، فوق تحصص کوارش و کبد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران)

سال ۱۴۰۳

آدرس: خیابان ستارخان - خیابان نیايش - مجتمع آموزشی دانشی حضرت رسول اکرم (ص) - تلفن: ۰۴۳۵۱۴۶

<http://hrmc.iums.ac.ir/>