


پاروتیدوئیدکتومی (جراحی غده پاروتید)

غدد پاروتید یک جفت غده بزاقی در دو طرف صورت هستند. برای درمان عفونت مزمن



پاروتید، انسداد غده و سرطان غدد بزاقی، پاروتیدکتومی یعنی خارج کردن غده پاروتید انجام می شود. جراحی پاروتیدکتومی به صورت سطحی یا کامل تحت بیهوشی عمومی انجام می گیرد. در پاروتیدکتومی سطحی، قسمت بیرونی پاروتید توسط برشی از جلوی گوش تا کردن برداشته می شود.

در پاروتیدکتومی کامل، غده به صورت کامل توسط برشی از جلوی گوش تا گردن خارج می شود. گاهی در این نوع، با توجه به محل تومور، برخی از اعصاب صورت و بافت های دیگر نیز برداشته می شود. بنابراین، ممکن است حرکت صورت پس از جراحی دچار اختلال شود.

آمادگی های قبل از جراحی:

- مصرف الکل و استعمال دخانیات قبل از جراحی ممنوع است؛ این مواد باعث افزایش احتمال بروز عوارض در حین جراحی و عدم بهبود کامل زخم پس از جراحی می شود.



- یک روز قبل، محل جراحی (صورت و گردن) را اصلاح کنید و موهای موضع را کوتاه نمایید.

- قبل از جراحی دوش بگیرید اما از استعمال هر گونه مواد آرایشی و عطر و ادکلن خودداری نمایید.

مراقبت های پس از جراحی:

- پس از جراحی، برای چند روز در بیمارستان بستری می شوید.



- برای پیشگیری از عفونت، جای بخیه ها با آب و صابون شستشو داده شود. (استفاده از الکل و پراکسید هیدروژن توصیه نمی شود، زیرا سبب تأخیر در بهبود زخم می شود)

- محل برش جراحی را تا بهبودی کامل، تمیز و خشک نگه دارید.



- برای بهداشت دهان، روزانه حداقل ۳-۴ بار، از دهان شویه یا محلول یک قاشق نمک در ۲۵۰ سی سی آب استفاده کنید.
- استفاده از رژیم مایعات تا بهبود محل جراحی در دهان لازم است.

- در صورت تجویز پزشک، آنتی بیوتیک ها و مسکن ها را سر ساعت مصرف کنید.
- تورم، کبودی و سخت شدن اطراف زخم بعد از عمل از **عوارض موقت جراحی** است. سختی اطراف زخم در هفته سوم به اوج رسیده اما ۲-۳ ماه بعد از عمل از بین می رود.



- حداقل تا دو هفته پس از جراحی، از بلند کردن اجسام سنگین، خم شدن، کشیدن سیگار، مصرف الکل و مسافرت هوایی اجتناب کنید.
- از مصرف غذاهای تند و ترش پرهیز شود.

عوارض :

این عوارض به ندرت اتفاق می افتند و معمولاً موقتی هستند:

- آسیب به اعصاب صورت و فلج صورت، احتمال آسیب همیشه وجود دارد ولی تلاش پزشک همیشه در حفظ عصب می باشد. ضعف عصبی موقتی بوده و جای نگرانی ندارد.
- درد هنگام جویدن
- بی حسی صورت و گوش

- عفونت
- خونریزی
- جای زخم (اسکار)
- ترشح بزاق از محل جراحی
- تورم مجرای تنفسی

توجه:

اگر دار مشکل در لبخند زدن، حرکت صورت یا نوشیدن مایعات شدید، بلافاصله به پزشک مراجعه کنید.



واحد آموزش به بیمار - مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی حضرت رسول اکرم (ص)

پاروتیدکتومی (جراحی غدد پاروتید)



مطمنیم: مهین قاسمی (کارشناس ارشد آموزش بهداشت و

ارتقاء سلامت)

تأیید کننده: دکتر صالح محبی (متخصص گوش و حلق و بینی،

فلوشیپ جراحی قاعده جمجمه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی

ایران)

سال ۱۴۰۳

آدرس: خیابان سارخان - خیابان نیایش - مجمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص) - تلفن: ۶۴۳۵۱

<http://hrmc.iums.ac.ir/>