



اپیستاکسی (خونریزی از بینی)

اپیستاکسی به معنای خونریزی از بینی است که ممکن است در سنین مختلف اتفاق بیفتد و جنس مذکر و جنس مونث به طور مساوی مبتلا می‌شوند.

دو نوع خونریزی بینی وجود دارد:

الف - خونریزی جلوی بینی

این خونریزی از مجموعه ای از رگ های خونی جلوی تیغه بینی ناشی می شود. این نوع خونریزی بینی را می توان در خانه به راحتی کنترل کرد. علل شایع این نوع خون دماغ عبارتند از:

- | | | | |
|---|-------------------------|---|-----------------------------|
| - | فین کردن شدید بینی | - | آلرژی ها |
| - | سرماخوردگی یا آنفلوآنزا | - | انحراف تیغه وسط بینی |
| - | خشکی مخاط | - | بیماری کبدی |
| - | سینوزیت | - | مصرف الکل و مواد مخدر |
| - | دستکاری بینی | - | مصرف داروهای رقیق کننده خون |
| - | هوای گرم یا سرد | | |



ب - خونریزی قسمت عقب بینی

خونریزی قسمت عقب بینی خیلی کمتر از خونریزی جلوی بینی اتفاق می افتد. این نوع خونریزی بینی در افراد مسن شایع تر است.

خونریزی پشت بینی می تواند خطرناک باشد و معمولاً نیاز به درمان پزشکی دارد.

علل شایع این نوع خونریزی بینی عبارتند از:

- برخی داروها مانند وارفارین، هپارین، آسپیرین و بروفن
- بیماری های خونی مانند لوسمی و هموفیلی
- آترواسکلروز
- تومورها
- ضربه به سر و صورت
- عمل جراحی بینی
- مواد محرک شیمیایی مانند سیگار، بنزین، آمونیاک، اسید سولفوریک و...
- فشار خون بالا (عامل ایجاد کننده نیست ولی می تواند خونریزی بینی را تشدید نماید).

بیمار عزیز چنانچه شما دچار خونریزی از بینی می شوید رعایت موارد زیر می تواند در بهبود شما مؤثر باشد:



- از قرار گرفتن در محیط های خشک اجتناب کرده و تا چند روز پس از قطع خونریزی از دستگاه بخور سرد کنار تختخواب، استفاده کنید.



- عطسه و سرفه با دهان باز انجام شود.
- از ضربه زدن به بینی به خصوص دستکاری بینی خودداری کنید.



- از فین کردن برای تخلیه بینی خودداری کنید.
- از فعالیت های شدید و برداشتن وزنه ۶-۴ هفته بعد از خونریزی خودداری نمایید.



- در صورت داشتن سابقه فشار خون بالا، جهت کنترل فشار خون به مراکز درمانگاهی مراجعه کنید.
- اگر از داروهای آسپرین دار (حاوی آسپرین) استفاده

می کنید پس از مشورت با پزشک مربوطه مصرف آن را قطع یا به حداقل برسانید.



* چنانچه خونریزی مجدداً اتفاق بیفتد به نکات زیر توجه

کنید:



- آرامش خود را حفظ کنید.
- اطراف سوراخ های بینی را به مدت ۱۰ دقیقه گرفته و محکم نگهدارید.
- بنشینید و سرتان را مقداری به سمت جلو خم نمایید (با دهان باز به نحوی که لخته های خون را بلع ننمایید).

- از کمپرس یخ استفاده کنید به طوری که کیسه یخ در پشت گردن و یا بالای بینی شما قرار گیرد.



- از اسپری های ضد احتقان بینی که هنگام ترخیص طبق تجویز پزشک به شما داده شده است استفاده کنید.

- در اسرع وقت به مراکز درمانی مراجعه نمایید.



واحد آموزش به بیمار - مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی حضرت رسول اکرم (ص)



مجمع آموزش و پژوهش در علوم سلامت - رسول اکرم (ص)

آموزش به بیمار

کد ۶۲

ایستاکسی (خونریزی از بینی)



مطّیسم: مهین قاسمی (کارشناس ارشد آموزش بهداشت و

ارتقا سلامت)

تأیید کننده: دکتر محمد مهدی سالم (متخصص گوش و حلق و بینی،

فلوشیپ جراحی سر و گردن، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم

پزشکی ایران)

سال ۱۴۰۳

آدرس: خیابان سارخان - خیابان نیایش - مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص) - تلفن: ۶۴۳۵۱

<http://hrmc.iums.ac.ir/>