


بلوک گانگلیون ایmpar (والتر)



در بیمارانی که از درد ناحیه تناسلی، مقعد رنج می‌برند می‌توان یکی از عصبهای آن ناحیه را بیحس نمود. این کار توسط پزشک و در اتاق عمل انجام می‌شود. این عمل بلوک گانگلیون ایmpar (والتر) گفته می‌شود.

شما در هنگام عمل دمر قرار می‌گیرید و آن محل استریل می‌شود. سپس بعد از بیحسی، توسط پزشک برای شما بلوک انجام می‌شود.





Coccygeus muscle
Coccyx
Sacrospinous ligament




عوارض:

پس از عمل ممکن است دچار این عوارض گذرا بشوید:

۱- خونریزی

۲- درد

۳- عفونت و تشکیل فیستول



- اگر دچار خونریزی شدید استفاده از کمپرس سرد در محل تزریق بسیار موثر است و درد شما کاهش می یابد.

- اگر دچار عفونت شدید، بلافاصله به پزشک مربوطه مراجعه کرده یا با ایشان تماس بگیرید. علائم عفونت تب و قرمزی و التهاب می باشد.

- در صورت بروز هرگونه اختلال روده‌ای مانند اسهال و یبوست یا اختلال مثانه‌ای مانند بی‌اختیاری یا عدم دفع ادرار فوراً به پزشک مربوطه مراجعه کنید.

بیمار گرامی لازم به ذکر است که در این بلوک:

- کاهش درد بیش از ۷۵ درصد می باشد. مدت بی‌دردی از ۴ هفته تا مادام‌العمر می باشد.
 - چنانچه از داروهای رقیق‌کننده خون استفاده می‌کنید قبل از عمل پزشک خود را مطلع کنید.
- شما پس از از بین رفتن کامل بیحسی پاها و ضعف قادر به راه رفتن هستید اما جهت خروج از بیمارستان حتماً باید یک نفر همراه داشته باشید.



واحد آموزش به بیمار - مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی حضرت رسول اکرم (ص)



آموزش به بیمار

کد ۵۸

بلوک گانگلیون ایمپار (والتر)

مطبعم‌کننده: مهین قاسمی (کارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سلامت)
تأییدکننده:

دکتر فرزاد ایمانی (فلوشیپ تخصصی درد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران)

دکتر پروکیم رحیم زاده (متخصص بی‌هوشی، فلوشیپ درد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران)



سال ۱۴۰۳

آدرس: خیابان سارخان - خیابان نیایش - مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص) - تلفن: ۶۴۳۵۱

<http://hrmc.iums.ac.ir/>