

## تست یورودینامیک چیست؟

یورودینامیک یا نوار مثانه یکی از مهمترین و کاربردی ترین تست های تشخیصی جهت بررسی عملکرد سیستم ادراری تحتانی (مثانه و مجرای ادرار) و نیز اعصاب مثانه و عضلات کف لگن می باشد.

### اهمیت تست یورودینامیک:

- تشخیص صحیح بیماری توسط پزشک
- افتراق بیماری های مختلف سیستم ادراری تحتانی
- تعیین استراتژی درمانی (درمان داروئی با جراحی)

### جهت چه مشکلاتی توصیه به انجام تست یورودینامیک می گردد؟

- تکرر ادرار
- فوریت ادرار (urgency)
- انواع بی اختیاری های ادراری و مدفع



- مشکلات دفع ادرار
- سوزش ادرار مداوم
- شب ادراری
- احتباس ادراری مقاوم
- مثانه پیش فعال
- اختلالات عملکرد اسفنگتربال مجرای ادراری

### چگونه یورودینامیک انجام می گردد؟

یورودینامیک با گذاشتن و فیکس کردن دو کاتتر (سوند) بسیار باریک که یکی از آنها در مجرای ادرار و دیگری در رکتوم قرار می گیرند، انجام می شود. علاوه براین ۳ الکترود



برای ثبت فعالیت عضلات در محل های مورد نظر قرار داده می شود. سوند مجرای ادراری فشار داخل مثانه را تعیین می کند و سوند رکتوم برای بررسی عملکرد عضلات کف لگن تعییه می شود.

### مراحل تست یوروودینامیک:

تست یوروودینامیک سه مرحله دارد:

- ۱- یورووفلومتری
- ۲- سیستومتری
- ۳- اندازه گیری میزان کفایت اسفنگتر

### ۱- یورووفلومتری

این مرحله دو قسمت دارد:

قسمت اول: بیمار مایعات مصرف می کند و بعد از احساس نیاز به تخلیه وارد اتاق انجام تست شده و تخلیه را در دستگاه مخصوص انجام می دهد و ادرار کردن بیمار بصورت منحنی رسم می گردد.

قسمت دوم: بلا فاصله بعد از ادرار کردن در شرایط استریل میزان باقی مانده ادرار توسط سوند اندازگیری و ثبت می شود.

### ۲- سیستومتری

در این مرحله دو کاتتر بسیار باریک به ترتیب یکی در مجرای ادرار و دیگری در رکتوم بیمار گذاشته می شود. علاوه بر آن ۳ الکترود برای ثبت فعالیت عضلات در محل های مورد نظر گذاشته می شود و سپس مثانه بیمار با سرم نرمال سالین پر می گردد. در طی این فرآیند منحنی عملکرد مثانه در طی پرشدن ثبت می گردد. سپس به بیمار دستور تخلیه ادرار داده می شود و در طی ادرار کردن مجدد منحنی عملکرد مثانه در فاز تخلیه نیز ثبت می شود.

### ۳- اندازه گیری میزان کفایت اسفنگتر

با خروج آهسته کاتتر مجرای ادرار وضعیت و کفایت عملکرد مثانه و اسفنگتر ادراری به صورت نمودار تشخیصی ثبت می گردد.

#### شرایط لازم جهت تست یوروودینامیک:

- جهت انجام یوروودینامیک نیاز به ناشتا بودن بیمار نمی باشد.

- عدم وجود عفونت ادراری (آزمایش ادرار منفی)

- با مثانه پر مراجعه شود.

- قطع داروهای درمانی اختلالات ادرار حداقل ۴۸ ساعت قبل از تست

- عدم مصرف غذاهای نفاخ و سنگین در شب قبل یا صبحانه همان روز

- تخلیه کامل سیستم گوارش خصوصا در کسانیکه مشکلات گوارشی از جمله بی اختیاری مدفوع دارند.

#### عوارض ناشی از انجام این تست یوروودینامیک چیست؟

بعد از انجام این تست بیمار ممکن است برای چند ساعت دچار ناراحتی خفیف یا درد هنگام ادرار شود. همچنین ممکن است مقدار اندکی خون در ادرار وجود داشته باشد که به علت داخل دادن کاتتر می باشد.

- بندرت عفونت ادراری بعد از انجام این تست بوجود می آید، لذا به جهت پیشگیری پزشک مرکز آنتی بیوتیک لازم را جهت مراجعه کننده تجویز می نماید.

- سوزش ادرار گاه تا ۷۲ ساعت پس از انجام تست می تواند طبیعی باشد که آشامیدن نیم لیتر آب در هر ۲ ساعت می تواند به کاهش عوارض بعد از تست کمک کند.

- همچنین گرفتن دوش آب گرم و قرار دادن پارچه نمناک و گرم بر روی مجرای ادراری نیز از مواردی است که توسط پزشکان توصیه می شود.

اگر بعد از انجام این تست با علائم عفونت، خستگی، درد یا تب وجود داشته باشد، بالافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.





# آموزش به سار

کد ۲۰۱

## تست یورودینامیک یا نوار مثانه

تئیه و تدوین: دکتر محمد علی قائد ( فوق تحصیل کنید و مجازی اداری،  
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران )

تنظیم کننده: مینی فاسی ( کارشناس ارشد آموزش بهداشت  
و ارتقا سلامت )



سال ۱۴۰۳

آدرس: خیابان ستارخان - خیابان نیایش - مجتمع آموزشی دانانی حضرت رسول اکرم (ص) - تلفن: ۰۴۳۵۱۶۴

<http://hrmc.iums.ac.ir/>